

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai perbedaan jumlah trombosit terhadap kejadian perdarahan *post-partum*, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

- 6.1.1 Jumlah trombosit pada ibu dengan perdarahan *post-partum* dengan nilai median 238.000 dan nilai minimum-maksimum adalah 82.000-725.000.
- 6.1.2 Jumlah trombosit pada ibu tanpa perdarahan *post-partum* dengan nilai median 240.000 dan nilai minimum-maksimum adalah 156.000-388.000.
- 6.1.3 Tidak terdapat perbedaan jumlah trombosit pada ibu yang melahirkan dengan perdarahan *post-partum* dan ibu melahirkan tanpa perdarahan *post-partum* di RS. Panti Wilasa dr.Cipto Semarang, dimana $p\ value = 0.613$.

6.2 Saran

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan jumlah trombosit terhadap kejadian perdarahan *post-partum* pada masa pandemi di RS. Panti Wilasa dr. Cipto Semarang, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 6.2.1 Bagi Peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini disarankan untuk mengambil sampel dengan lebih banyak dan demografi lain agar dapat mendukung hasil penelitian yang lebih baik.
- 6.2.2 Bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan adanya penelitian ini diharap dapat menambah pustaka mengenai trombosit terhadap kejadian perdarahan *post-partum*, mengingat kesehatan ibu dan anak saat ini menjadi isu yang penting.